

# VALORI MEDII ALE UNEI VARIABILE ALEATOARE DIN PLANUL EUCLIDIAN $E_2$

RODICA TRANDAFIR  
Universitatea Spiru Haret

**Rezumat:** În această lucrare se calculează valorile medii ale unor variabile aleatoare atașate unor familii de figuri convexe din planul euclidian  $E_2$ .

**Cuvinte cheie:** figuri convexe, valori medii

Fie  $E_2$  planul euclidian de coordonate carteziane ortogonale  $x, y$ . Grupul de mișcări din acest plan este grupul  $G_3$  al transformărilor ortogonale definit de operatorii

$$X_1 f = \frac{\partial f}{\partial x}, X_2 f = \frac{\partial f}{\partial y}, X_3 f = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}; \quad (1)$$

cu structura:

$$(X_1, X_2) = 0, (X_1, X_3) = X_2, (X_2, X_3) = -X_1.$$

În [4] am considerat o familie de varietăți  $\mathcal{F}_1$  cu doi parametri din  $E_2$  de ecuație

$$F(x, y, \alpha, \beta) = 0$$

și am notat prin  $G_r(x) \subseteq G_3$  grupul maxim invariantă a familiei și  $H_r(\alpha, \beta)$  grupul atașat lui.

În legătură cu  $H_r(\alpha, \beta)$  se poate arăta că [4] formează un grup izomorf cu grupul  $G_r$  de invariantă a familiei de varietăți.

Familia  $\mathcal{F}_2$  de curbe este măsurabilă dacă grupul  $H_r$  este măsurabil, deci în particular el trebuie să fie tranzitiv. Rezultă că  $2 \leq r \leq 3$ .

Dacă  $r = 2$  rezultă că grupul maxim de invariantă al familiei este un subgrup cu doi parametri ai grupului (1), deci este un grup abelian

$$G_2 \equiv [X_1, X_2].$$

În [4] se arată că singurele familii cu doi parametri de curbe măsurabile din planul euclidian sunt familiile de drepte din plan și familiile de curbe:

$$F(x - \alpha, y - \beta) = 0 \quad (2)$$

și au măsura

$$\mu(Q) = \iint_{Q_\alpha} d\alpha d\beta. \quad (3)$$

Să considerăm planul euclidian  $E_2$  în care măsura elementară a mulțimii dreptelor din plan este

$$dG = [dpd\varphi] \quad (4)$$

unde  $p$  și  $\varphi$  sunt coordonatele normale ale duplei  $G$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$  și  $0 \leq p \leq l \cos \varphi$ .

Fie o figură convexă  $K_0$  fixă și  $\{K_1, \dots, K_m\}$  un sistem de  $m$  figuri convexe aleatoare ca poziție, independente, uniform repartizate, congruente cu o figură convexă  $K$  și care intersectează  $K_0$ .

Notăm prin  $K_m = K_0 \cap (K_1 \cap \dots \cap K_m)$  figura obținută ca intersecție a lui  $K_0$  cu cele  $m$  corpuri  $K_1, \dots, K_m$ . Dacă  $l_m$  este lungimea lui  $K_m$ ,  $l_m$  este o variabilă aleatoare. În [2] s-a determinat valoarea medie a variabilei aleatoare  $l_m$  și anume:

$$E[l_m] = \frac{2^m}{[2\pi(b_0 + b) + L_0 L]^m} \int_{(G \cap K_0 \neq \emptyset)} (\pi S + L\lambda)^m dG \quad (5)$$


unde  $S_0$  este aria lui  $K_0$ ,  $L_0$  lungimea sa,  $S$  și  $L$  aria respectiv lungimea figurii convexe  $K$ , iar  $\lambda$  este lungimea corzii determinate pe o dreaptă oarecare din plan prin intersecția cu  $K_0$ .

Vom determina  $E[l_m]$  în cazul în care  $K_0$  este un pătrat de latură  $a_0$ , iar  $K$  un dreptunghi de laturi  $a, b$  sau o bandă infinită de lățime  $a$ .

Pentru calcularea valorii  $E[l_m]$  trebuie să determinăm valoarea integralei

$$I_n = \int_{(G \cap K_0 \neq \emptyset)} \lambda^n dG \quad (6)$$

Considerăm pătratul  $K_0$  cu centrul în origine și cu laturile paralele cu axele de coordonate



Împărțind intervalul  $[0, 2\pi]$  în intervalele  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right], \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right], \dots, \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$  și notăm distanța de la origine la dreapta ce trece prin vârful A cu

$$p_{\max} = \frac{a_0}{2} (\cos \varphi + \sin \varphi), 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \quad (7)$$

și

$$p^* = \frac{a_0}{2} (\cos \varphi - \sin \varphi), 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}. \quad (8)$$

dacă  $G$  trece prin vârful  $D$ .

Avem

$$\lambda = \begin{cases} \frac{a_0}{\cos \varphi}, 0 \leq p \leq \frac{a_0}{2} (\cos \varphi - \sin \varphi) \\ \frac{a_0 (\cos \varphi + \sin \varphi) - p}{\sin \varphi \cos \varphi}, \frac{a_0}{2} (\cos \varphi - \sin \varphi) \leq p \leq \frac{a_0}{2} (\cos \varphi + \sin \varphi) \end{cases} \quad (9)$$

Împărțind intervalul  $[0, 2\pi]$  în intervalele  $\left[0, \frac{\pi}{4}\right], \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right], \dots, \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$  avem:

$$I_n \left[0, \frac{\pi}{4}\right] = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \left[ \int_0^{\frac{a_0}{2} (\cos \varphi - \sin \varphi)} \frac{a_0^n}{\cos^n \varphi} dp + \int_{\frac{a_0}{2} (\cos \varphi - \sin \varphi)}^{\frac{a_0}{2} (\cos \varphi + \sin \varphi)} \left( \frac{a_0 (\cos \varphi + \sin \varphi) - p}{\sin \varphi \cos \varphi} \right)^n dp \right] = \quad (10)$$

$$= \frac{a_0^{n+2}}{2(n+2)} \left[ 1 - 2^{\frac{n-1}{2}} (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d\varphi}{\cos^{n-1} \varphi} \right]$$

Notând cu  $V(n) = (n+1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d\varphi}{\cos^{n-1} \varphi}$ , rezultă că  $I_n \left[ 0, \frac{\pi}{4} \right] = \frac{a_0^{n+2}}{2(n+2)} \left[ 1 - 2^{\frac{n-1}{2}} V(n) \right]$ .

Să luăm o altă poziție a dreptei  $G$  și anume, să considerăm că  $G$  trece prin vârful  $B$ , iar  $p_1^*$  este distanța de la origine la  $G$  în acest caz

Avem că  $p_1^* = \frac{a_0}{2} (-\cos \varphi + \sin \varphi)$  și

$$\lambda = \begin{cases} \frac{a_0}{\sin \varphi}, 0 \leq p \leq \frac{a_0}{2} (-\cos \varphi + \sin \varphi) \\ \frac{a_0 (\cos \varphi + \sin \varphi)}{\sin \varphi \cos \varphi}, \frac{a_0}{2} (-\cos \varphi + \sin \varphi) \leq p \leq \frac{a_0}{2} (\cos \varphi + \sin \varphi) \end{cases} \quad (11)$$

Avem:

$$I_n \left[ \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} \right] = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left[ \int_0^{\frac{a_0(-\cos \varphi + \sin \varphi)}{2}} \frac{a_0^n}{\sin^n \varphi} dp + \int_{\frac{a_0(-\cos \varphi + \sin \varphi)}{2}}^{\frac{a_0(\cos \varphi + \sin \varphi)}{2}} \left( \frac{a_0 (\cos \varphi + \sin \varphi) - p}{\sin \varphi \cos \varphi} \right)^n dp \right] = I_n \left[ 0, \frac{\pi}{4} \right], \quad (12)$$

deci  $I_n \left[ 0, \frac{\pi}{4} \right] = I_n \left[ \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] = \dots = I_n \left[ \frac{7\pi}{4}, 2\pi \right]$ .

Avem deci :

$$I_n = \frac{4a_0^{n+1}}{n+1} \left[ 1 - 2^{\frac{n-1}{2}} V(n) \right], \quad (13)$$

dar

$$E[l_m] = \frac{2^m}{[2\pi(S+S_0) + L_0L]^m} \int_{(G \cap K_0 \neq \emptyset)} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (\pi S)^{m-k} L^k \lambda^k dG. \quad (14)$$

Dacă  $K$  este un dreptunghi de laturi  $a, b$  avem:

$$E[l_m] = \frac{4a_0}{\left[ 1 + \frac{a_0^2}{ab} + 4 \frac{a_0}{\pi} \left( \frac{a+b}{ab} \right) \right]^m} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \left( \frac{2a_0}{\pi} \right)^k \left( \frac{a+b}{ab} \right)^k \frac{1 - 2^{\frac{k-1}{2}} + V(k)}{k+1}, \quad (15)$$

iar pentru  $a=b$  avem:

$$E[l_m] = \frac{4a_0}{\left[1 + \frac{a_0^2}{a^2} + \frac{8a_0}{\pi a}\right]^m} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \left(\frac{4a_0}{\pi a}\right)^k \frac{1}{k+1} \left[1 - 2^{\frac{k-1}{2}} + V(k)\right]. \quad (16)$$

Dacă  $K$  este o bandă infinită de lățime  $a$  făcând  $b \rightarrow \infty$  rezultă:

$$E[l_m] = \frac{4a_0}{\left[1 + \frac{4a_0}{a}\right]^m} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \frac{1 - 2^{\frac{k-1}{2}} + V(k)}{k+1} \left(\frac{4a_0}{\pi a}\right)^k. \quad (17)$$

### BIBLIOGRAFIE

1. Deltheil, R., *Probabilités géométriques*. Gauthier-Villars, 1926.
2. Stoka, M., *Les espérances mathématiques de quelques variables aléatoires associées à des figures convexes dans des espaces euclidiens*. Rend. Circ. Matem. di Palermo, 1973.
3. Stoka, M., *Geometrie integrală*, Ed. Academiei Române, 1967
4. Trandafir, R., *Familles des courbes mesurables du plan euclidien*, Rev. Roum. De Math. Pures et Appl., Ed. Academiei Române, 1966.
5. Trandafir, R., *Les espérances mathématiques et les variances de quelques variables aléatoires associées à des familles d'orales*. Bull. De la Classe des Sciences. Acad. Royale de Belgique, 1974.

**Abstract:** This paper presents computing results concerning the mean value of random variables associated to some families of convex shapes belonging to the Euclidian space  $E_2$ .